

SINTOMA	CAUSA	TRATAMIENTO	
		PRODUCTO	POSOLOGIA
Diarrea, anemia, sed intensa, adelgazamiento, pérdida de plumas y en casos graves puede llegar a ocasionar la muerte.	Infestación producida por gusanos redondos (nemátodos).	 TABERNIL VERMICIDA	2 ml/litro ó 2 gotas/40 ml en el agua de bebida, un solo día, pudiéndose repetir a las 2-3 semanas en caso necesario.
- Postración, embolamiento, diarrea blanquecina/amari-llenta que puede llegar a ser sanguinolenta. - Adelgazamiento progresivo.	Proceso producido por protozoos parásitos (coccidios).	 TABERNIL SURFA	1,5 ml/litro ó 3 gotas/100 ml en el agua de bebida, durante tres días seguidos, descansar dos días y seguir con tres días más de tratamiento.
- Inquietud. Abandono de nidales. Pérdida de pluma por picaje. - Adelgazamiento progresivo.	Infestación producida por parásitos externos (piojos, garrapatilla roja etc. . ).	 TABERNIL INSECTICIDA SPRAY	Aplicar sobre el plumaje durante un par de segundos evitando la pulverización directa sobre los ojos. Pulverizar jaulas, nidales palos, etc.
Costras, escamosidades, callosidades.	Infestación por ácaros dérmicos (sarna).	TABERNIL INSECTICIDA POLVO	Espolvorear directamente sobre animales, jaulas y utensilios.
		TABERNIL POMADA	Aplicar directamente sobre la zona afectada.
Cese del canto en los machos.	Carencia hormonal y/o vitamínica.	 TABERNIL CANTO	10 ml/litro ó 25 gotas/40 ml en el agua de bebida durante 2-3 veces/semana, pudiendo llegar a 4-5 veces semanales durante la preparación para concursos.
Color poco intenso en los canarios de Factor Rojo.	Aporte insuficiente de pigmentos en la dieta.	 TABERNIL COLOR	20ml/200 g mezclado con el bizcocho o pasta ó 5 gotas por canario y día.

SINTOMA	CAUSA	TRATAMIENTO	
		PRODUCTO	POSOLOGIA
- Disminución del instinto sexual. - Inviabilidad de los huevos.	Estados carenciales debidos a deficiencias en el aporte o exceso de demanda de vitamina A, D3 y E	TABERNIL A-D3-E	4 ml/ 1 ó 4 gotas/40 ml en el agua de bebida diariamente 20 días antes del apareamiento.